

Lista Filogenética das espécies de aves da área de influência da ARIE “PARQUE JK” (Córrego Cortado), Distrito Federal. Classificação, nomenclatura e ordem filogenética das aves segundo Sick (1997).

Taxa* <i>Espécie</i>	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
Ordem TINAMIFORMES										
Família Tinamidae										
<i>Crypturellus undulatus</i>	Jaó			Cin.	F2	ON	X			B3
<i>Crypturellus parvirostris</i>	Inhambú-chororó			Cin.	C2	ON	X	ZR	3	C,B1,B2,B3
<i>Rhynchotus rufescens</i>	Perdiz			Cin.	C1	ON	X	ZR	3	C,B1,B2,B3
<i>Nothura minor</i>	Codorna-buraqueira	Vuln.,MMA	End., Cer.	Cin.	C1	ON	X			B3
<i>Nothura maculosa</i>	Codorna			Cin.	C1	ON	X	ZR	3	C,B1,B2,B3
<i>Taoniscus nanus</i>	Inhambú-carapé	Vuln.,MMA	Cer.		C1	ON	X			B3
Ordem RHEIFORMES										
Família Rheidae										
<i>Rhea americana</i>	Ema		Próx.		C1	ON	X			B3
Ordem PODICIPEDIFORMES										
Família Podicipedidae										
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Mergulhão-pequeno				A	PI	X			B3
<i>Podilymbus podiceps</i>	Mergulhão-caçador				A	PI	X			B3
Ordem PELECANIFORMES										
Família Phalacrocoracidae										
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá, mergulhão				A	PI		V	1	C,B1,B3
Família Anhingidae										
<i>Anhinga anhinga</i>	Biguatinga				A	PI	X			B1,B3
Ordem CICONIIFORMES										
Família Ardeidae										
<i>Ardea cocoi</i>	Maguari				A	PI	X			B1,B2,B3
<i>Casmerodius albus</i>	Garça-branca-grande				A	PI		V	1,3	C,B1,B2,B3
<i>Egretta thula</i>	Garça-branca-pequena				A	PI				B1,B3
<i>Bubulcus ibis</i>	Garça vaqueira			Sin.	C2	PI				B1,B3
<i>Butorides striatus</i>	Socozinho				A	PI		VZ	1	C,B1,B2,B3
<i>Syrigma sibilatrix</i>	Maria-faceira				C2	CA				B1,B2,B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Pilherodius pileatus</i>	Garça-real				A	PI				B1,B3
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Taquiri				A	PI				B1,B3
	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi-ferrugem				A	PI	X			B1
Família	Threskiornithidae										
	<i>Theristicus caudatus</i>	Curicaca				C2	CA		V	3	C,B2,B3
	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Corocoró				F2	PI		VZ	1	C,B1,B2,B3
	<i>Phimosus infuscatus</i>	Tapicuru				A	ON				B1,B2
	<i>Platalea ajaja</i>	Colhereiro				A	PI	X			B1
Família	Ciconiidae										
	<i>Mycteria americana</i>	Cabeça seca				A	PI				B1
	<i>Jabiru mycteria</i>	Tuiuiú				A	PI				B1
Família	Cathartidae										
	<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei				F2	CA	X			B3
	<i>Coragyps atratus</i>	Urubu-preto			Sin.	C2	CA	X	VF	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Cathartes aura</i>	Urubu-caçador			Sin.	C2	CA	X			B2,B3
Ordem	ANSERIFORMES										
Família	Anatidae										
	<i>Dendrocygna viduata</i>	Irerê		Migr.	Cin.	A	ON	X			B1,B3
	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Marreca-asa-branca		Migr.	Cin.	A	ON	X			B1,B3
	<i>Netta erythrophthalma</i>	Paturi-preta				A	ON	X			B3
	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Ananai		Migr.	Cin.	A	ON	X			B1,B2,B3
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Pato-de-crista				A	ON				B3
	<i>Cairina moschata</i>	Pato-do-mato			Cin.	A	ON	X			B3
Ordem	FALCONIFORMES										
Família	Accipitridae										
	<i>Elanus leucurus</i>	Gavião peneira				C1	CA				B1,B2,B3
	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Gaviãozinho				F2	CA				B1,B2,B3
	<i>Leptodon cayanensis</i>	Gaivão-da-cabeça-cinza				F2	CA				B3
	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Águia chilena				C2	CA	X			B3
	<i>Buteo albicaudatus</i>	Gavião-fumaça				C1	CA		V	1,3	C,B2,B3
	<i>Rupornis magnirostris</i>	Pinhé, Gavião-carijó			Sin.	F2	CA		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Casaca-de-couro				C2	CA		V	3	C,B1,B2,B3
	<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	Águia-cinzenta	Vuln.,MMA			C2	CA	X			B3
	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Gavião-pernilongo				F2	CA				B3
Família	Pandionidae										
	<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pescadora		VN		A	PI	X			B1,B3
Família	Falconidae										
	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Acauã				F2	CA		Z	1	C,B1,B2,B3
	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Gavião-relogio				F2	CA				B3
	<i>Milvago chimachima</i>	Gavião-carrapateiro			Sin.	C2	CA				B1,B2,B3
	<i>Caracara plancus</i>	Carcará			Sin.	C2	ON		VZF	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira				C1	CA				B1,B2,B3
	<i>Falco sparverius</i>	Quiriquiri			Sin.	C1	CA		V	3	C,B1,B2,B3
Ordem	GALLIFORMES										
Família	Cracidae										
	<i>Penelope superciliaris</i>	Jacu			Cin.	F2	ON	X			B3
	<i>Crax fasciolata</i>	Mutum-de-penacho			Cin.	F2	ON	X			B3
Ordem	GRUIFORMES										
Família	Rallidae										
	<i>Rallus nigricans</i>	Saracura-preta				F2	ON		ZR	1	C,B1,B2
	<i>Aramides cajanea</i>	Saracura-três-potes		Migr.		F2	ON		Z	1	C,B1,B2,B3
	<i>Porzana albicollis</i>	Sanã carijó				C2	ON				B2,B3
	<i>Laterallus xenopterus</i>	Sanã-de-cara-ruiva	Vuln.			C1	ON	X			B3
	<i>Laterallus viridis</i>	Pinto-d'água				F2	ON				B2
	<i>Micropygia schomburgkii</i>	Maxalalagá	Próx.			C1	ON	X			B2,B3
	<i>Gallinula chloropus</i>	Frango-d água-comum				A	ON				B1,B3
Família	Cariamidae										
	<i>Cariama cristata</i>	Seriema				C1	CA				B2,B3
Ordem	CHARADRIIFORMES										
Família	Jacanidae										
	<i>Jacana jacana</i>	Jaçanã				A	PI				B1,B3

Taxa* <i>Espécie</i>	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
Família Charadriidae										
<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero			Sin.	A	CA		VZF	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Pluvialis dominica</i>	Batuiruçu		VN		A	PI	X			B3
<i>Charadrius collaris</i>	Batuíra-de-colar				A	PI	X			B3
Família Recurvirostridae										
<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo				A	PI	X			B3
Família Scolopacidae										
<i>Tringa flavipes</i>	Maçarico-de-perna-amarela		VN		A	PI	X			B1,B3
<i>Tringa solitaria</i>	Maçarico		VN		A	PI	X			B1,B3
<i>Calidris fuscicollis</i>	Maçariquinho		VN		A	ON	X			B3
<i>Calidris melanotos</i>	Maçariquinho-de-colete		VN		A	ON	X			B3
<i>Gallinago paraguaiae</i>	Narceja				A	ON				B1,B2,B3
<i>Gallinago undulata</i>	Narcejão				A	ON				B3
Família Rynchopidae										
<i>Rynchops niger</i>	Tralha-mar				A	PI	X			B3
Ordem COLUMBIFORMES										
Família Columbidae										
<i>Columba livia</i>	Pomba-doméstica		Intr.		T	GI		V	1,2,3	C,B1
<i>Columba picazuro</i>	Pomba-asa-branca				C2	GI		VF	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Columba cayennensis</i>	Pomba-galega				C2	GI				B1,B2,B3
<i>Columba plumbea</i>	Pomba-amargosa				F2	GI				B3
<i>Zenaida auriculata</i>	Avoante			Cin.	C1	GI	X			B1,B2
<i>Columbina passerina</i>	Rolinha-cinzenta				C2	GI				B3
<i>Columbina minuta</i>	Rolinha-de-asa-canela				C2	GI				B3
<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha-caldo-de-feijão			Sin.	C2	GI		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Scardafella squammata</i>	Fogo-apagou				C2	GI		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti-pupú			Cin.	F2	GI	X			B1,B2
<i>Leptotila rufaxilla</i>	Juriti-gemedeira			Cin.	F2	GI	X	VZ	1,3	C,B2,B3
Ordem PSITTACIFORMES										
Família Psittacidae										

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Ara ararauna</i>	Arara-canindé			Com.	C2	FI	X			B2
	<i>Orthopsittaca manilata</i>	Maracanã-do-buriti		Amaz.		C2	FI				B2
	<i>Diopsittaca nobilis</i>	Maracanã-nobre				F2	FI				B2,B3
	<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Maritaca			Com.	F2	FI	X	VZ	3	C,B2,B3
	<i>Aratinga jandaya</i>	Jandaia				F2	FI				B3
	<i>Aratinga aurea</i>	Periquito-rei			Com.	C2	FI	X	VZ	3	C,B2,B3
	<i>Forpus xanthopterygius</i>	Tuim-de-asa-azul				F2	FI		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Brotogeris chiriri</i>	Periquito-da-asa-amarela				F2	FI		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Pionus menstruus</i>	Curica			Com.	F1	FI	X			B1
	<i>Pionus maximiliani</i>	Maitaca-de-garganta-azul				F2	FI				B3
	<i>Amazona xanthops</i>	Papagaio-galego	Vuln.	Cer.		C2	FI	X			B1,B2,B3
	<i>Amazona aestiva</i>	Papagaio-verdadeiro			Com.	F2	FI	X	VZ	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Amazona amazonica</i>	Papagaio-grego			Com.	F2	FI	X	VZ	1	C,B1,B3
Ordem CUCULIFORMES											
Família Cuculidae											
	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Papa-lagarta-canela				F2	CA				B1
	<i>Coccyzus americanus</i>	Papa-lagarta-americano		VN		F2	CA				B3
	<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato				F2	CA		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Crotophaga ani</i>	Anú-preto			Sin.	C2	CA		VZF	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Guira guira</i>	Anu-branco			Sin.	C2	CA		VZF	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Tapera naevia</i>	Saci				F2	CA		Z	1	C,B1,B2,B3
Ordem STRIGIFORMES											
Família Tytonidae											
	<i>Tyto alba</i>	Suindara			Sin.	C2	CA				B1,B2,B3
Família Strigidae											
	<i>Otus choliba</i>	Corujinha-orelhuda				C2	CA		Z	1	C,B2,B3
	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Caburé				C2	CA				B2,B3
	<i>Speotyto cunicularia</i>	Coruja-buraqueira				C2	CA		VZR	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Rhinoptynx clamator</i>	Mocho-orelhudo				C2	CA				B3
Ordem CAPRIMULGIFORMES											
Família Nyctibiidae											

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
Família	<i>Nyctibius griseus</i>	Mãe-da-lua				F2	IN				B1,B2
	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Bacurau-de-asa-fina				C1	IN				B3
	<i>Podager nacunda</i>	Coruçã				C1	IN				B2,B3
	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Curiango				F2	IN		VZR	3	C,B1,B2,B3
	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	Bacurau-ocelado				F2	IN				B3
	<i>Caprimulgus parvulus</i>	Bacurau-chintã				C1	IN				B2,B3
	<i>Hydropsalis brasiliiana</i>	Bacurau-tesoura				C2	IN				B1,B2,B3
	<i>Eleothreptus anomalus</i>	Curiango-do-banhado	Próx.			A	IN	X			
Ordem	APODIFORMES										
Família	Apodidae										
	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Andorinhão-de-coleira				C2	IN				B1,B3
	<i>Chaetura andrei</i>	Andorinhão-de-garganta-branca				C2	IN				B1,B2,B3
	<i>Reinarda squamata</i>	Taperá-do-buriti				C2	IN		VZ	3	C,B1,B2,B3
Família	Trochilidae										
	<i>Phaetornis pretrei</i>	Limpa-casa-do-rabo-branco				F2	NI	X			B1,B2,B3
	<i>Eupetomena macroura</i>	Tesourão				F2	NI		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Melanotrochilus fuscus</i>	Beija-flor-preto-e-branco		Atlânt.		F2	NI	X			B1
	<i>Colibri serrirostris</i>	Beija-flor-do-canto				C2	NI	X	VZ	3	C,B1,B2
	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Beija-flor-preto				F2	NI	X			B1
	<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	Besourinho-de-bico-vermelho				F2	NI	X	V	1	C,B1
	<i>Thalurania furcata</i>	Beija-flor-de-barriga-violeta				F2	NI	X			B1,B2,B3
	<i>Leucochloris albicollis</i>	Beija-flor-de-papo-branco		Atlânt.		F2	NI	X			B3
	<i>Amazilia fimbriata</i>	Beija-flor-de-garganta-verde				C2	NI		V	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Heliactin cornuta</i>	Chifre-de-ouro				C2	NI	X			B2,B3
	<i>Calliphlox amethystina</i>	Estrelinha-ametista				F2	NI	X			B3

Taxa* <i>Espécie</i>	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
Ordem TROGONIFORMES										
Família Trogonidae										
<i>Trogon surrucura</i>	Surucuá-de-peito-azul				F2	FI				B1
Ordem CORACIFORMES										
Família Alcedinidae										
<i>Ceryle torquata</i>	Matraca, Martim-pescador			A	PI	X	VZF	1,3		C,B1,B2,B3
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martim-pescador-verde			A	PI	X	VZ	1		C,B1,B2,B3
<i>Chloroceryle americana</i>	Martim-pescador-pequeno			A	PI	X				B1,B2,B3
Ordem PICIFORMES										
Família Galbulidae										
<i>Brachygalba lugubris</i>	Ariramba-preta			F1	IN	X				B1
<i>Galbula ruficauda</i>	Bico-de-agulha			F2	IN		VZR	1,3		C,B1,B2,B3
Família Bucconidae										
<i>Nystalus chacuru</i>	João-bobo			C1	ON		ZR	3		C,B1,B2,B3
Família Ramphastidae										
<i>Ramphastos vitellinus pintoi</i>	Tucano-do-bico-preto			F2	ON					B1,B2
<i>Ramphastos dicolorus</i>	Tucano-do-bico-verde		Atlânt.	F1	ON					B3
<i>Ramphastos toco</i>	Tucanuçu			C2	ON		V	1		C,B1,B2,B3
Família Picidae										
<i>Picumnus albosquamatus</i>	Pica-pau-anão			F2	IN		VZ	1,2,3		C,B1,B2,B3
<i>Colaptes campestris</i>	Pica-pau-do-campo			C2	IN		V	3		C,B1,B2,B3
<i>Colaptes melanochloros</i>	Pica-pau-verde-barrado			C2	IN		VZ	1,3		C,B1,B2,B3
<i>Celeus flavescens</i>	João-velho			F2	IN					B3
<i>Dryocopus lineatus</i>	Pica-pau-de-sobre-branca			C2	IN					B1,B2,B3
<i>Melanerpes flavifrons</i>	Benedito-de-testa-amarela		Atlânt.	F2	IN					B1,B3
<i>Melanerpes candidus</i>	Pica-pau-preto-e-branco			C2	IN					B1,B2,B3
<i>Veniliornis passerinus</i>	Pica-pau-verde			F2	IN		VZ	1		C,B1,B2,B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Picoides mixtus</i>	Pica-pau-chorão				C1	IN	X			B2,B3
	<i>Campephilus melanoleucus</i>	Pica-pau-de-topete-vermelho				F2	IN				B1,B2,B3
Ordem PASSERIFORMES											
Família Rhinocryptidae											
	<i>Melanopareia torquata</i>	Meia-lua-do-cerrado		Cer.		C1	IN	X			B2,B3
	<i>Scytalopus novacapitalis</i>	Tapaculo-de-Brasília	Vuln.	End., Cer.		F2	IN	X			B3
Família Thamnophilidae											
	<i>Taraba major</i>	Choró-boi				F2	IN		V	1	C,B1,B2,B3
	<i>Thamnophilus punctatus</i>	Choca-bate-cabo				F2	IN				B1,B2,B3
	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Choca-da-mata				F1	IN				B1,B3
	<i>Thamnophilus torquatus</i>	Choca-de-asa-vermelha				C2	IN				B1,B3
	<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	Chorozinho-de-chapéu-preto				F2	IN		VZ	1,3	C,B1,B2,B3
Família Conopophagidae											
	<i>Conopophaga lineata</i>	Chupa-dente		Atlânt.		F1	IN	X			B3
Família Furnariidae											
	<i>Geobates poecilopterus*</i>	Andarilho	MMA	Cer.		C1	IN	X			B1,B3
	<i>Furnarius rufus</i>	João-de-barro				C2	IN		VZF	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Synallaxis hypospodia</i>	João-grilo				F2	IN				B1,B3
	<i>Synallaxis frontalis</i>	Petrim				F2	IN		Z	1	C,B1,B2,B3
	<i>Synallaxis albescens</i>	Vipí				C1	IN				B1,B2,B3
	<i>Poecilurus scutatus</i>	Estrelinha-preta				F1	IN				B3
	<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	Curutié				A	IN	X			B1,B3
	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	João-graveto				C2	IN		Z	3	C,B2,B3
	<i>Phacellodomus ruber</i>	Graveteiro-do-buriti				C2	IN				B2,B3
	<i>Anumbius annumbi</i>	Cochicho				C1	IN	X			B3
	<i>Philydor dimidiatus</i>	limpa-folhas-ferrugem	Próx.	Cer.		F1	IN	X			B3
	<i>Philydor lichtensteini</i>	limpa-folhas-de-coroa-cinza		Atlânt.		F1	IN	X			B3
	<i>Philydor rufus</i>	limpa-folhas-de-testabaia				F2	IN				B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Automolus leucophthalmus</i>	Barranqueiro-de-olho-branco		Atlânt.		F1	IN	X			B3
	<i>Hylocryptus rectirostris</i>	Barranqueiro	Próx.	Cer.		F2	IN	X			B1,B2
	<i>Xenops rutilans</i>	Bico-virado-carijó				F2	IN				B1,B3
	<i>Lochmias nematura</i>	João-porca				F1	IN		Z	1	C,B1,B2,B3
Família	Dendrocolaptidae										
	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapaçu-verde				F2	IN				B1,B2,B3
	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	Arapaçu				F1	IN				B3
	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Arapaçu-do-cerrado				C2	IN		VZ	3	C,B1,B2,B3
Família	Tyrannidae										
	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Risadinha				C2	FI		VZR	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Suiriri suiriri affinis</i>	Suiriri-cinzento				C2	IN		V	3	C,B1,B2,B3
	<i>Elaenia flavogaster</i>	Guaracava				F2	FI		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Elaenia cristata</i>	Guaracava-de-topete				C2	IN		VZ	3	C,B1,B2,B3
	<i>Elaenia chiriquensis</i>	Chibum				C2	IN		VZR	3	C,B1,B2,B3
	<i>Elaenia obscura</i>	Tucão				F2	IN				B3
	<i>Culicivora caudacuta</i>	Papa-moscas-do-campo	Próx.,MMA			C1	IN	X			B2,B3
	<i>Mionectes oleagineus</i>	Abre-asa				F1	IN	X			B2
	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Cabeçudo				F1	IN				B1,B2,B3
	<i>Corythopsis delalandi</i>	Estalador		Atlant.		F1	IN	X			B1,B3
	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	Sebino-do-olho-de-ouro				F2	IN				B2,B3
	<i>Todirostrum cinereum</i>	Relógio				F2	IN		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Bico-chato				F2	IN		V	1	C,B1,B2,B3
	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Patinho				F1	FI				B1,B2,B3
	<i>Myiobius barbatus</i>	Assanhadinho-de-peito-dourado				F1	IN	X			B1,B3
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Felipe				F2	IN		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Contopus cinereus</i>	Papa-moscas-cinzento		Atlânt.		F2	IN				B3
	<i>Lathrotriccus euleri</i>	Enferrujado				F1	IN	X			B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Guaravacuçu				F2	IN				B3
	<i>Xolmis cinerea</i>	Maria-branca				C2	IN		VF	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Xolmis velata</i>	Noivinha-branca				C1	IN				B1,B3
	<i>Knipolegus lophotes</i>	Maria-preta-de-topete				C2	IN				B3
	<i>Fluvicola albiventer</i>	Lavadeira-de-máscara			Rio	A	IN				B1
	<i>Arundinicola leucocephala</i>	Lavadeira-de-cabeça-branca			Rio	A	IN				B1,B3
	<i>Colonia colonus</i>	Viuvinha				F1	IN		VZ	1	C,B1,B2,B3
	<i>Alectrurus tricolor</i>	Galito	Próx.,MMA			C1	IN	X			B3
	<i>Gubernetes yetapa</i>	Tesoura-do-brejo				C2	IN				B1,B2,B3
	<i>Satrapa icterophrys</i>	Suiriri-do-brejo				F1	IN				B1,B3
	<i>Machetornis rixosus</i>	Suiriri-cavaleiro				C1	IN		VZ	2,3	C,B1
	<i>Casiornis fusca</i>	Caneleiro-enxofre		End.		F2	IN	X			B2
	<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira				F2	IN		VZ	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria-cavaleira-de-rabo-ferrugem				C2	IN				B3
	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Irrê				C2	IN		VZ	3	C,B3
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bem-te-vi			Sin.	F2	ON		VZF	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Philohydor lictor</i>	Bem-te-vi-do-brejo				A	IN				B1
	<i>Megarhynchus pitangua</i>	Bem-te-vi-do-bico-chato			Sin.	F2	ON		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Bem-te-vizinho-do-brejo				F2	FI		VZ	1,2,3	C,B1,B2
	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado				F2	ON				B1,B2,B3
	<i>Legatus leucophaeus</i>	Bem-te-vi-pirata				F2	FI				B3
	<i>Empidonomus varius</i>	Peitica				F2	FI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	Peitica-de-chapéu-preto				F2	FI		V	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Tyrannus savana</i>	Tesourinha				C2	IN		VZ	3	C,B1,B2,B3
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri			Sin.	C2	ON		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Tyrannus albogularis</i>	Suiriri				C2	IN				B1,B2,B3
	<i>Pachyramphus viridis</i>	Caneleiro-verde				F2	FI				B3
	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Caneleiro-preto				F2	FI				B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Tityra cayana</i>	Anambé-branco				F2	FI				B3
	<i>Tityra inquisitor</i>	Anambé-branco				F2	FI				B3
Família	Pipridae										
	<i>Antilophia galeata</i>	Soldadinho		Cer.		F2	FI	X	Z	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Neopelma pallescens</i>	Fruxu				F1	FI				B3
	<i>Schiffornis virescens</i>	Flautim-verde		Atlânt.		F2	FI				B3
Família	Cotingidae										
	<i>Pyroderus scutatus</i>	Pavó				F1	FI	X			B3
Família	Hirundinidae										
	<i>Tachycineta albiventer</i>	Andorinha-do-rio				A	IN	X			B1
	<i>Tachycineta leucorrhoea</i>	Andorinha-de-sobre-branca				C1	IN	X			B3
	<i>Phaeoprogne tapera</i>	Andorinha-do-campo				C2	IN				B1,B2,B3
	<i>Progne chalybea</i>	Andorinha-grande-de-casa			Sin.	C2	IN		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-de-casa-pequena			Sin.	C2	IN		VF	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Andorinha-serrador				C1	IN		V	3	C,B1,B2,B3
	<i>Stelgidopteryx fucata</i>	Andorinha-morena				C2	IN				B2,B3
	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-de-bando		VN		C1	IN				B3
	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Andorinha-de-dorso-canela		VN		C1	IN				B3
Família	Corvidae										
	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	Gralha-do-cerrado		Cer.		C2	ON	X			B1,B2,B3
	<i>Cyanocorax cyanopogon</i>	Cancã		End.		F2	ON	X			B1,B3
Família	Troglodytidae										
	<i>Donacobius atricapillus</i>	Japacamim				A	IN		VZ	1	C,B1
	<i>Cistothorus platensis</i>	Corruíra-do-campo				C1	IN	X			B2,B3
	<i>Thryothorus genibarbis</i>	Garrinchão-pai-avô				F2	IN				B1
	<i>Thryothorus leucotis</i>	Garrinchão				F2	IN		ZR	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Troglodytes aedon</i>	Corruíra			Sin.	C2	IN		VZ	2,3	C,B2,B3
Família	Muscicapidae										

Taxa* <i>Espécie</i>	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
Subfamília Sylviinae										
<i>Poliophtila dumicola</i>	Balança-rabo				F2	IN		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
Subfamília Turdinae										
<i>Turdus subalaris</i>	Sabiá-ferreiro				F2	FI				B3
<i>Turdus rufiventris</i>	Sabiá-laranjeira			Com.	F2	FI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-barranco			Com.	F2	FI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiapoca			Com.	C2	FI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Turdus fumigatus</i>	Sabiá-da-mata		Amaz.		F1	FI				B3
<i>Turdus albicollis</i>	Sabiá-de-coleira			Com.	F2	FI		V	1	C,B3
Família Mimidae										
<i>Mimus saturninus</i>	Sabiá-do-campo				C2	FI		VZF	2,3	C,B1,B2,B3
Família Motacilidae										
<i>Anthus lutescens</i>	Caminheiro				C1	IN				B2,B3
Família Vireonidae										
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Pitiguari				F2	FI		VZR	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Vireo chivi</i>	Juruviara				F2	FI		VZ	1	C,B1,B2,B3
Família Emberizidae										
Subfamília Parulinae										
<i>Parula pitaiyumi</i>	Mariquita				F2	IN		V	1	C,B1,B2,B3
<i>Geothlyps aequinoctialis</i>	Pia-cobra				A	IN		VZR	1	C,B1,B2,B3
<i>Basileuterus flaveolus</i>	Pula-pula-amarelo				F2	IN				B1,B2,B3
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Pichito				F2	IN				B1,B2,B3
<i>Basileuterus leucophrys</i>	Pula-pula-de-sombrancelha		End., Cer.		F1	IN	X	VZR	1	C,B1,B2,B3
Subfamília Coerebinae										
<i>Coereba flaveola</i>	Cambacica				F2	NI		VZF	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Dacnis cayana</i>	Saí-azul				F2	NI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Saí-beija-flor				F2	NI	X			B1
<i>Conirostrum speciosum</i>	Figuinha-de-rabo-castanho				F2	NI	X			B1,B3
Subfamília Thraupinae										
<i>Schistochlamys melanopsis</i>	Tiê-cinza				C2	FI				B1,B2,B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Neothraupis fasciata</i>	Tiê-do-cerrado	Próx.	Cer.	.	C1	FI	X			B2,B3
	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	Bandoleta	Próx.	Cer.		C1	FI	X			B1,B2,B3
	<i>Cissopis leveriana</i>	Tietinga			Com.	F2	FI	X			B1
	<i>Thlypopsis sordida</i>	Saíra-canário				F2	FI		V	1	C,B1,B2,B3
	<i>Hemithraupis guira</i>	Saíra-do-papo-preto				F2	FI		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Nemosia pileata</i>	Saíra-de-chapéu-preto				F2	FI				B2
	<i>Eucometis penicillata</i>	Pipira-da-taoca				F2	FI				B1,B3
	<i>Tachyphonus rufus</i>	Pipira-preta				F2	FI		V	1	C,B1,B2,B3
	<i>Trichothraupis melanops</i>	Tiê-de-topete		Atlânt.		F1	FI	X			B1,B3
	<i>Piranga flava</i>	Sanhaço-de-fogo				C2	FI				B1,B3
	<i>Ramphocelus carbo</i>	Pipira-de-veludo				F2	FI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Thraupis sayaca</i>	Sanhaço			Com.	F2	FI		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Thraupis palmarum</i>	Sanhaço-do-coqueiro			Com.	F2	FI		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Euphonia chlorotica</i>	Vivi				F2	FI		Z	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Euphonia violacea</i>	Guriatã			Com.	F2	FI	X			B1
	<i>Tangara cayana</i>	Saíra-macaco				F2	FI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Tersina viridis</i>	Saí-andorinha				F2	FI		V	1,2,3	C,B1,B3
Subfamília	Emberizinae										
	<i>Zonotrichia capensis</i>	Tico-tico				C2	GI		VZ	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Ammodramus humeralis</i>	Tico-tico-rato				C1	GI		VZR	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Sicalis citrina</i>	Canário-rasteiro				C1	GI		VZ	3	C,B1,B2,B3
	<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-verdadeiro			Com.	C2	GI				B3
	<i>Emberizoides herbicola</i>	Canário-do-campo				C2	GI				B1,B2,B3
	<i>Volatinia jacarina</i>	Tiziu			Sin.	C2	GI		VZ	2,3	C,B1,B2,B3
	<i>Haplospiza unicolor</i>	Cigarrinha-do-bambu				F1	GI	X			B3
	<i>Sporophila plumbea</i>	Patativa-verdadeira				C2	GI				B1,B2,B3
	<i>Sporophila lineola</i>	Bigodinho			Com.	A	GI	X			B3
	<i>Sporophila nigricollis</i>	Baiano			Com.	C2	GI		V	1,3	C,B1,B2,B3
	<i>Sporophila caerulescens</i>	Coleirinho			Com.	C2	GI	X			B1,B3
	<i>Sporophila leucoptera</i>	Patativa-chorona				C2	GI				B1
	<i>Sporophila bouvreuil</i>	Caboclinho				C1	GI				B1,B2,B3

Taxa*	Espécie	Nome vulgar	Status	Distr.	Import	Hábito	Dieta	Bio.	Reg.	Sítios	Fonte
	<i>Oryzoborus angolensis</i>	Curió			Com.	F2	GI	X			B3
	<i>Arremon flavirostris</i>	Tico-tico-de-bico-amarelo				F1	FI				B1,B2,B3
	<i>Charitospiza eucosma</i>	Mineirinho	Próx.	Cer.		C1	GI	X			B2,B3
	<i>Coryphaspiza melanotis</i> *	Tico-tico-do-campo	Vuln.,MMA			C1	GI	X			B2,B3
	<i>Coryphospingus pileatus</i>	Tico-tico-rei-cinza				F2	GI				B1,B2,B3
	<i>Paroaria dominicana</i> * #	Galo-de-campina		End., Intr.		C2	GI		V	1	C,B1
Subfamília Cardinalinae											
	<i>Saltator similis</i>	Trinca-ferro			Com.	F2	FI		VZ	1	C,B1,B2,B3
	<i>Saltator atricollis</i>	Batuqueiro		Cer.		C1	FI	X			B2,B3
	<i>Porphyrospiza caeruleascens</i>	Azulão-do-cerrado	Próx.	Cer.		C1	GI	X			B3
Subfamília Icterinae											
	<i>Icterus jamacaii</i>	Sofrê			Com.	F2	FI	X			B1
	<i>Agelaius ruficapillus</i>	Garibaldi				A	FI				B1
	<i>Leistes militaris</i>	Polícia-inglesa				C1	FI				B1,B2
	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	Chopim-do-brejo				C2	FI				B3
	<i>Gnorimopsar chopi</i>	Pássaro-preto			Com.	C2	FI		VZ	3	C,B1,B2,B3
	<i>Molothrus bonariensis</i>	Iraúna			Sin.	C2	FI		VZ	2,3	C,B1,B2,B3
Família Passeridae											
	<i>Passer domesticus</i>	Pardal		Intr.		T	GI		V	1,2,3	C,B1,B2,B3
Família Estrildidae											
	<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre		Intr.		C1	GI		VZ	1,2,3	C,B1,B2,B3

- **Status (de Conservação)** => Espécies incluídas na lista de espécies ameaçadas, segundo Collar *et al.*(1994), nas categorias: Vuln. vulnerável; Próx. quase ou próxima de ser considerada ameaçada (near endangered). **MMA** - Espécies incluídas na Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Instrução Normativa N° 3, de 27 de maio de 2003, Ministério do Meio Ambiente).
- **Distribuição (Distr.)** => **End**- espécies endêmicas do Brasil, **Cer.** espécie endêmica do Cerrado; **Amaz.**- espécies com centro de distribuição amazônico; **Atlânt.**- espécies com centro de distribuição atlântica (Silva, 1996); **VN**- visitante da América do Norte; **Migr.** espécies migratórias; **Intr.** espécie introduzida (exótica à fauna brasileira).
- **Importância econômica (Import)** => **Cin.** espécies com valor cinegético; **Com.** espécies com valor comercial, alvos do tráfico de animais e criação doméstica e **Sin.** - espécies sinântropas.

- **Hábito** => **A** - Espécies estritamente aquáticas; **C1** - Espécies estritamente campestres; **C2** - Espécies essencialmente campestres que utilizam também florestas; **F2** - Espécies essencialmente florestais que utilizam também ambientes abertos; **F1** - Espécies estritamente florestais.
- **Dieta** => As guildas alimentares: **CA** carnívoros; **FI** frugívoros e insetívoros; **IN** insetívoros, **NI** nectarívoros e insetívoros **GI** granívoros e insetívoros; e, **ON** onívoros, **PI** - piscívoro e insetívoro.
- **Bio.** => **Bioindicadores** de qualidade ambiental, entre elas: 1) ameaçadas de extinção; 2) espécies endêmicas (do Brasil e do Cerrado); 3) espécies exclusivas de ambientes específicos; 4) espécies de valor cinegético e visadas pelo tráfico de animais silvestres, cujas populações sofram riscos de extinção local; e por fim, 5) espécies sensíveis a impactos ambientais de relativa importância ecológica: nectarívoras e frugívoras (polinizadores, dispersores), piscívoras e carnívoras (animais de topo de cadeia alimentar).
- **Registro:** **(F)** registro fotográfico, **(V)** visualização (observação direta), **(Z)** Registro por zoofonia (identificação dos cantos e chamados); **(R)** gravação de áudio (registro sonoro).
- **Sítios** => **(1)** Parque Vivencial Onoyama, **(2)** Parque Vivencial Cortado, **(3)** Parque Vivencial Três Meninas.

Fonte (do registro) => **(C)** referem-se a registro efetuados durante o trabalho de campo (dados primários; os demais são dados bibliográficos (secundários) referentes a: **(B1)** Monitoramento da Avifauna do Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo (Abreu *et al.*, 2000); **(B2)** Monitoramento Científico da Fauna na A.P.A. Gama/Cabeça de Veado, referente à construção da segunda pista do Aeroporto Internacional de Brasília (dados pessoais) **(B3)** Aves do Parque Nacional de Brasília (Antas, 1995).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.