



Foto 17 - Perfil representativo da Unidade de Mapeamento Rubd2, NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico antrópico textura argilosa fase Mata Ciliar e Campo Sujo Úmido relevo plano substrato Metarritmito Argiloso (ANTROPOSSOLO). Ponto 17 (48). Y 8245950 X 172387,5.



Foto 18 - Perfil representativo da Unidade de Mapeamento RQg1. NEOSSOLO QUARTZARÊNICO HIDROMÓRFICO A FRACO, fase Campo Limpo Úmido e Campo Sujo Úmido relevo suave - ondulado substrato Quartzito Médio. Ponto 9 (16). Coord.: Y 8244225 X 167750



Foto 19 - Perfil representativo da Unidade de Mapeamento LVd1 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico A moderado textura muito argilosa fase Cerrado Típico relevo plano e suave - ondulado substrato Metarritmito Arenoso com intercalações de Quartzitos e Metassiltitos, Ponto 19 (52). Y 8242999 X 172124



Foto 20 - Perfil representativo da Unidade de Mapeamento FFcd1. PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário Distrófico A moderado textura argilosa concrecionária fase Cerrado Ralo e Campo Sujo Seco relevo suave - ondulado a ondulado substrato couraça laterítica maciça fragmentada + Afloramento de Rocha (couraça laterítica). Ponto 27. Coord.: Y 8240800 X 163500



Foto 21 - Perfil representativo da Unidade de mapeamento PVAd1. ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico latossólico A moderado textura muito argilosa fase Cerrado Típico e Mata de Galeria não Inundável relevo suave - ondulado substrato Metarritmito Arenoso com intercalações de Quartzito e Metassiltito. Ponto 14 (37, 41). Coord.: Y 8247950 X 170787,5




Foto 22 - Perfil representativo da Unidade de Mapeamento CXbd4 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico, léptico, a moderado, textura média cascalhenta, fase Cerrado Ralo, relevo suave a ondulado, substrato quartzito médio (80%) + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico, léptico, plíntico, a moderado, textura média concrecionária, fase Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre, relevo suave a ondulado, substrato quartzito médio, abaixo do nível de couraça laterítica (20%), Ponto 8 (14). Y 8243850 X 167750



Foto 23 - Perfil representativo da Unidade de Mapeamento CXbdc5. CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico léptico plíntico A moderado textura média cascalhenta fase Cerrado Ralo e Campo Sujo Úmido relevo ondulado a forte-ondulado substrato Quartzito Médio + afloramento de rocha de quartzito. Ponto 47. Face N-S, no sentido perpendicular ao acamamento da rocha. Y 8244650 X 167350

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.