



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL  
Comissões do Hospital Veterinário Público de Brasília

**A Vacina V10 para Caninos**

A V10, também conhecida como décupla, é uma das principais aliadas quando o assunto é imunização de cães e cadelas. Essa vacina é responsável por prevenir cerca de sete doenças graves. É importante citar que esse imunizante pode dar ao animal mais conforto, pois ao invés dele precisar tomar setevacinas para se proteger, ele pode tomar apenas a vacina V10 e ter a proteção completa.

As doenças que a V10 previne são: leptospirose, cinomose, hepatite infecciosa canina, coronavirose, parvovirose, parainfluenza e adenovirose. A vacina V10 pode ser aplicada nos cães quando eles ainda são filhotes, a partir dos 45 dias de vida.

Os efeitos colaterais não são muito comuns, mas podem se manifestar. Os mais frequentes são: febre, inchaço na região da aplicação e sensação de desânimo. Mas não se desespere se o animal sentir dor no local durante 48 horas. Além disso, ardência, sede excessiva (polidipsia) e letargia também são muito comuns de ocorrer. Não se preocupe. No entanto, se o animal continuar apresentando reações por mais de 48h entre em contato com a equipe da unidade móvel do Hvep.

**A Vacina V4 para felinos**

A vacina V4 proporciona proteção contra as seguintes doenças: rinotraqueíte; calicivirose; panleucopenia; e clamidiose.

As vacinas de felinos podem causar algumas reações adversas em até três dias após a aplicação. As reações mais frequentes são letargia e febre, cuja ocorrência é de 54% dos casos. Dor e inchaço no local de aplicação ou vômito são sintomas que também podem acontecer, mas com uma menor frequência. se o animal continuar apresentando reações por mais de 72h entre em contato com a equipe da unidade móvel do Hvep.

Observação: o protocolo inicial para filhotes de caninos e felinos de vacinação são três doses com intervalo de 21 dias. E depois reforço anualmente com uma dose.